Håndtering af prøver

Inden analyserne bestilles, beder vi rekvirenten om at læse og udfylde den elektroniske rekvisition:
'Rekvireringsskema for porfyrisygdomme'
Herunder kan du finde de forskellige udredningspakker, og hvilke prøveglas der skal indsendes.

Det er vigtigt, at alle analyser i udredningspakken bestilles elektronisk og indsendes.

Akut porfyripakke
Kutan porfyripakke
Kutan porfyripakke, udvidet
Efterbestilling af fæces
Opfølgning af kendt porfyrisygdom
Forsendelse

For al udredning gælder

- Hospitaler bestiller analyserne elektronisk i BCC og LABKA II.
- Praktiserende læger i almen praksis kan ikke bestille porfyrianalyser.
- Praktiserende speciallæger kan bestille porfyrianalyser efter individuel aftale med vores afdeling.
- Alle udfylder den elektroniske rekvisition.
- Prøvemateriale sendes beskyttet mod lys ved indpakning i stanniol/sølvpapir og opbevares på køl (2-8 ^{o}C) indtil forsendelse.
- **OBS! Haste Urin-ALA/PBG (porfyri forstadier) udføres kun efter telefonisk aftale.**

Akut porfyripakke

- Send:3 x 10 ml. morgenurin/spoturin uden tilsætning.
- 3 x 4 ml. heparinblod (ikke fra gelglas) ELLER min. 3 x 1,5 ml. afpipetteret plasma (ikke fra gelglas).
- Beskyt mod lys med stanniol.



For brugere af BCC og Labka II

Bestil: U-Porfyrin forstadier, U-Porfyrintype, P-Porfyrintype, OG udfyld den elektroniske rekvisition

Forsendelse

Ved udredning af akut porfyrisygdom (akut intermitterende porfyri, varigat porfyri, hereditær koproporfyri):

- Urinprøve bør tages i den symptomatiske fase (når anfald med mavesmerter har varet 1-2 dage).
- Selv hos en porfyripatient kan et normalt resultat forekomme, hvis prøven er taget udenfor et porfyrianfald. Gentag evt. ALA/PBG under anfald.
- Ved brug af methenamin (hippurat) (Haiprex), bør dette præparat seponeres minimum 3 dage før prøvetagning, da det kan interferere med måling af ALA/PBG.
  Alternativt skal det oplyses ved rekvirering, at patienten tager det.

Kutan porfyripakke:

Send

- 3 x 10 ml. morgenurin/spoturin uden tilsætning.
- 3 x 4 ml. heparinblod (ikke fra gelglas) ELLER min. 3 x 1,5 ml. afpipetteret plasma
- Beskyt mod lys med stanniol.



For brugere af BCC og Labka II:

Bestil: U-porfyrintype, P-porfyrintype, OG udfyld den elektroniske rekvisition


Forsendelse

Kutan porfyripakke, udvidet:

Tages ved akutte smerter i huden efter lyseksponering.

Send

- **Kutan porfyripakke** **OG** 3 x 3-5 ml. EDTA-blod.
- Beskyt mod lys med stanniol



For brugere af BCC og Labka II:

Bestil: U-porfyrintype, P-porfyrintype og Ercs(B)-Protoporfyrin, OG udfyld den elektroniske rekvisition

Forsendelse

Efterbestilling af fæces

Send

- Fæcesprøve min. 5 g. (2 spiseskeer).
- Beskyt mod lys med stanniol.

For brugere af BCC og Labka II:

Bestil: F-Fæcestype, OG udfyld den elektroniske rekvisition

Forsendelse

Opfølgning af kendt porfyrisygdom

Akut intermitterende porfyri (AIP), varigat porfyri (VP) og hereditær koproporfyri (HCP)

- Send 3 x 10 ml. morgenurin/spoturin uden tilsætning.
- Beskyt mod lys med stanniol.

For brugere af BCC og Labka II:

Bestil: U-porfyrin forstadie. NB. Hasteprøver aftales telefonisk, OG udfyld den elektroniske rekvisition

Forsendelse

Porphyria cutanea tarda (PCT)

- Send 3 x 10 ml. morgenurin/spoturin uden tilsætning.
- Beskyt mod lys med stanniol.

For brugere af BCC og Labka II:

Bestil U-Porfyrintype, OG udfyld den elektroniske rekvisition

Forsendelse

Erytropoietisk protoporfyri (EPP)

- Send 3 x 3-5 ml. EDTA blod.
- Beskyt mod lys med stanniol.

For brugere af BCC og Labka II:

Bestil Ercs(B)-Protoporfyrin, OG udfyld den elektroniske rekvisition

Forsendelse

Forsendelse

OBS! Prøvemateriale til Porfyrilaboratoriet skal sendes mellem mandag og torsdag som Quickbrev, idet materialet skal være modtaget inden 3 døgn efter prøvetagning.

Hvis prøvetagning sker en fredag, i weekenden eller på en helligdag, skal prøverne håndteres som følger:

- Urinprøver: Fryses ved -20 °C.
- Li-Hep fuldblod: Centrifugeres, afpipetteres og plasma fryses ved -20 °C.
- EDTA fuldblod: Måling af EVF inden prøven fryses ved -20 °C. Resultat på EVF medsendes. Husk at angive dato for hvornår denne er taget.
- **Alle prøvematerialer sendes på frost mandag.**

Genetisk udredning foretages af Klinisk Genetisk Afdeling, OUH.

For lægelig rådgivning eller tolkning af analysesvar: Tlf. 29 24 02 51.

For øvrige spørgsmål, kontakt Porfyrilaboratoriet: Tlf. 29 64 77 62 / 23 35 10 89.