

Til: Almen praksis, speciallægepraksis samt Røde Kors Centre, som rekvirerer Helicobacter Pylori-undersøgelse på KBA Svendborg eller SSI

**Vedrørende: Helicobacter Pylori-breath test erstattes af Helicobacter Pylori fæces Antigen - undersøgelsen**

Fra **15. august 2025** erstattes Helicobacter Pylori "puste prøven"  
**Helicobacter pylori(pustepr.);Mave (NPU 19568)**

af

Helicobacter Pylori antigen i fæces (svarer til den Helicobacter Pylori-antigen test, der udføres på SSI)  
**Helicobacter pylori (Ag);F (NPU 17885)**

Desværre vil vores nuværende beholdning af glas til pusteprøver ikke række til den 15. august 2025. Derfor vil vi fra dags dato og frem til den 15. august 2025 udsende fæces-opsamlingskits til patienter, hvor der er rekvireret en pusteprøve (OBS: antigen testen kan ikke bestilles før den 15. august 2025. Derfor skal man fortsat bestille pusteprøve i WebReq, og laboratoriet vil herefter automatisk konvertere analysen til fæces antigen testen, som vil blive analyseret efterhånden som de modtages (**OBS: alle udleverede pusteprøve kits kan bruges mindst de næste 3 mdr.**)

Det er derfor vigtigt, at patienterne informeres om, at de skal opsamle en fæcesprøve og ikke en pusteprøve. Fra den 15. august 2025 vil fæces antigen testen blive tilgængelig i WebReq som lovet i den udsendte information.

Fra 15. august 2025 skal prøveopsamlingskit derfor udleveres af egen læge, som det allerede foregår for eksempelvis måling af fæces calprotectin. Prøveopsamlingskit kan rekvireres fra Blodprøver og Biokemi, Odense via ILS.

Prøven lægges i medfølgende adresserede kuvert til

**Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Sygehusenheden i Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg**

og kan afleveres

**Hos egen læge, eller**

**I en PostNord postbutik/Pakkeshop, eller**

**På et af følgende sygehuslaboratorier**

- **Odense:** Blodprøver og Biokemi, Blodprøvetagningsambulatoriet, Klørvænget 47, indgang 40, 5000 Odense
- **Nyborg:** Klinisk Biokemisk Ambulatorium Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg
- **Svendborg:** Klinisk Biokemisk Ambulatorium, Baagøes Alle 15, Indgang 85, 1. sal, Rum S, 5700 Svendborg
- **Ærø:** Klinisk Biokemisk Ambulatorium, Sygehusvejen 18, 5970 Ærø

Analysekarakteristika, tolkning, svartid m.v. fremgår af vedhæftede analysevejledning, som også kan findes på Klinisk Biokemisk Afdeling OUH Svendborgs hjemmeside.

### Kontaktpersoner:

**Helle Glud Binderup**  
Biokemiker, ph.d.  
Klinisk Biokemisk Afdeling, SVB  
[helle.glud.binderup@rsyd.dk](mailto:helle.glud.binderup@rsyd.dk)  
Tlf. 51 64 43 79

**Lennart Jan Friis-Hansen**  
Overlæge, dr.med.  
Blodprøver og Biokemi  
[lennart.jan.friis-hansen@rsyd.dk](mailto:lennart.jan.friis-hansen@rsyd.dk)  
Tlf.: 21 99 82 10

### Fortolkning

Helicobacter Pylori antigen i fæcestestens sensitivitet og specificitet svarer til Helicobacter Pylori "pusteprovens" sensitivitet og specificitet.

Resultaterne vil derfor også blive afgivet på samme måde som tidligere:

- **Positiv:** Helicobacter pylori antigen påvist
- **Negativ:** Helicobacter pylori antigen ikke påvist
- **Inkonklusiv:** Dette svar afgives, hvis det underliggende måleresultat ved både den første måling og ved den automatiske genmåling falder i omslagsområdet for testen. I disse tilfælde udbedes en ny prøve.

For at få et korrekt resultat er det vigtigt at overholde følgende:

Patienten må ikke være i behandling med antibiotika (f.eks. Amoxicillin, Clarithromycin, Metronidazol m.fl.) de sidste 4 uger før undersøgelsen.

Patienten må ikke have været i behandling med syrehæmmende medicin de sidste 2 uger før undersøgelsen, dvs. stop indtagelsen af Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, Pariet og Nexium. I stedet kan anvendes syreneutraliserende midler som Novaluzid, Balancid, Alminox og lignende.

Testen er tillige velegnet til kontrol efter eradikationsbehandling - 4-6 uger efter endt eradikationsbehandling - idet antigen forsvinder ved ophørt infektion, hvorimod antistofniveauet forbliver forhøjet i ca. 6 mdr.

Se i øvrigt vejledning for prøveopsamling.