

Afføringsprøve- Opsamling af Helicobacter Pylori antigen

Til patienter og pårørende

patienten først OUH

Vejledning – opsamling af Helicobacter Pylori antigen afføringsprøve

Din forberedelse inden prøvetagning

Brug af antibiotika og stærkt syredæmpende medicin (proton-pumpe hæmmere) kan give forkerte testresultater.


- Kur mod Helicobacter Pylori eller anden antibiotika-behandling skal være afsluttet mindst 4 uger før testen udføres.
- Brug af stærkt syredæmpende medicin (fx Omeprazol, Pantoprazol og Nexium) skal være ophørt 2 uger før testen udføres.


Ud over disse to forbehold må du spise, drikke og tage din anden medicin, som du plejer.

Prøvesættet indeholder

Prøverør med podepind	Opsamlingspapir til afføring	Kuvert	Vejledning	Prøvetagnings-blanket
				

Fremgangsmåde for opsamling af afføringsprøve

	Trin 1: Gør prøverøret klar Sæt label med stregkoden på prøverøret. Stregkoden skal sættes på langs af prøverøret og skal dække den eksisterende etikette. <i>Læs trin 5 før du fortsætter – prøven skal sendes/afleveres samme dag</i>
	Trin 2: Fold opsamlingspapiret ud og sæt det fast på toiletsædet Læs vejledning på opsamlingspapiret. Kontrollér at opsamlingspapiret sidder godt fast på toiletsædet. Undgå urin på afføringen. <i>Hvis du ikke har fået udleveret opsamlingspapir af din praktiserende læge eller brugen af det mislykkes, kan du bruge flere lag toiletpapir til at holde afføringen over vandet i toilettet (meget vigtigt).</i>

	Trin 3: Opsamling af afføringsprøven Brug podepinden til at overføre afføring til prøverøret – mængden skal svare til størrelsen af en ært. Vær opmærksom på der er væske i prøverøret. Væsken må ikke løbe ud!  Skub podepinden helt ned til bunden af prøverøret og knæk podepinden sv.t. brudzonen. Skru låget godt fast på prøverøret! Kom prøverøret i plastikposen. Notér, hvornår prøven er opsamlet på etiketten på plastikposen.
	Trin 4: Skyl ud Brug stort skyl. Der bør trækkes ud 2-3 gange sv.t. 10-15 L vand for at sikre, at fæces opsamlingspapir og fæces skylles ud.
	Trin 5: Forsendelse Prøverøret i plastikposen lægges i medfølgende adresserede boblekuvert. <i>Det er vigtigt, at prøven kommer hurtigt frem til hospitalet for, at den er brugbar.</i> Derfor kan du aflevere kuverten hos: Din egen læge (mandag – fredag). AFLEVERES HELST INDEN KL. 12.00, så prøven kan nå til laboratoriet samme dag. I en PostNord postbutik/Pakkeshop (mandag – torsdag). Må ikke sendes op til en weekend (fredag). På et af følgende sygehuslaboratorier (mandag – fredag kl 8-15): • Odense: Blodprøver og Biokemi, Blodprøvetagningsambulatoriet, Klørvænget 47, indgang 40, 5000 Odense • Nyborg: Klinisk Biokemisk Ambulatorium Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg • Svendborg: Klinisk Biokemisk Ambulatorium, Baagøes Alle 15, Indgang 85, 1. sal, Rum S, 5700 Svendborg • Ærø: Klinisk Biokemisk Ambulatorium, Sygehusvejen 18, 5970 Ærø
Svar	Trin 6: Resultat Selvom resultatet vil være tilgængeligt på Sundhed.dk, er det vigtigt, at du taler med den læge, der har bestilt undersøgelsen om, hvordan svaret skal tolkes, samt hvordan der skal handles på svaret.