

Medicinvejledning TCA (Amitriptylin og Noritren)

Medicinvejledning TCA (Amitriptylin og Noritren)

Hvad er Amitriptylin og Noritren

De medicinske præparater Amitriptylin og Noritren har igennem mange år været brugt som behandling mod depression. Det er igennem de senere år påvist, at Amitriptylin og Noritren også har en god effekt på nervesmerter, som er smerter, der typisk brænder, svier eller jager. Dosis til smertebehandling er mindre end dosis til behandling af depression.

Hvordan hjælper Amitriptylin og Noritren

Amitriptylin og Noritren kan lindre smerter, forbedre din søvn og dermed være med til at give øget livskvalitet. Amitriptylin ordineres i én dosis til sovetid, da dette præparat fortrinsvis virker smertestillende og sløvende, hvorimod Noritren ordineres i en til to doser, morgen og middag, da dette præparat virker smertestillende og opkvikkende. Amitriptylin og Noritren kan kombineres i smertebehandlingen.

Hvordan skal jeg tage Amitriptylin og Noritren

Du skal begynde på en lav dosis og langsomt øge til den dosis, der passer til dig. På den måde opnår du den bedste effekt og de færreste bivirkninger.

Hvornår

Det er individuelt, men erfaringen viser, at der er begyndende virkning efter 2-4 dage.

Er der bivirkninger

Der kan være bivirkninger, men ved at starte med en lav dosering, og trappe behandlingen langsomt op, kan bivirkningerne minimeres. Af bivirkninger kan blandt andet nævnes mundtørhed, forstoppelse, svedtendens, mental ændring, træthed, og risiko for vægtøgning. Bivirkningerne er ofte mest udtalte i

starten af behandlingen, og ved ændring i dosis.

Hvor længe og hvor meget skal jeg tage af Amitriptylin og Noritren

Disse spørgsmål afklares i samråd med Smertecentret, mens du er i behandling her. Du øger i dosis ved hjælp af vedlagte optrapningsskema, og vi vil holde tæt kontakt, når du begynder på behandlingen.

Praktiske råd

Amitriptylin og Noritren forstærker den sløvende virkning af alkohol, sovemedicin og beroligende medicin. Forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening tilrådes. Hos læger og tandlæger skal du huske at fortælle, du er i behandling med TCA, da visse lokalbedøvende midler sammen med TCA kan bewirke forhøjelse af blodtrykket.

Ekg (hjertediagram) og blodprøvetagning

Ekg tages ved start på behandlingen for at udelukke, at der er forstyrrelser i hjerterytmen, som Amitriptylin og Noritren kan forværre. Blodprøven tages, når du er nået op på en dosering på ca. 50 mg i døgnet. Dette gøres for at kontrollere koncentrationen af præparaterne i blodbanen. Således kan vi indstille din behandling mest præcist, samtidig med, at vi følger balancen mellem virkning og bivirkning.

Blodprøve på 50 mg efter 7 dages behandling

Behandles du med Noritren, skal du vente med at tage Noritren, til efter blodprøven er taget. Tid for blodprøvetagning og ekg skal bestilles på nærmeste sygehus.

Smertecenter Syd, Odense

Kontakt

Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Odense
Smertecenter
Heden 7-9, indgang 200, 1. sal
5000 Odense C
65 41 38 69
