## Elektronisk opsætningskontrol af blodkomponenter

Proceduren skal udføres af en person og foretages uforstyrret ved patientens side.

- 1. Log på EPJ og åbn patientens journal.
- 2. Åbn menupunktet og vælg InterInfo-aktuelt sygehus.
- 3. Vælg fanebladet Elektronisk opsætningskontrol.

Patientinformation	Transfusionsmed. analyser	Blodbestilling	Elektronisk opsætningskontrol	Transfusionshistorik	Immunologiske analyser
Opsætningskontro	ol				
Afdeling For at komme afdelingskode, trykkes blot Er Næste	i gang med opsætning. For at komme til opsæ nter.	skontrollen på ope etningskontrollen p	erationsafdelingerne ska Så alle andre afdelinger (	l der angives en angives ingen afdeling. De	? <b>r</b>
« <u>Ny patient</u>					Log ud »
		💧 Pa	rt of ProSang CSAM Health		

4. Feltet Afdeling skal ikke udfyldes, vælg Næste.

Patientinformation	Transfusionsmed. analyser	Blodbestilling	Elektronisk opsætningskontrol	Transfusionshistorik	Immunologiske analyser
Opsætningskontr	ol				
Patient-id Blodkomponent Del Del	1 2 Udfør opsætningsk	ontrol	1		
Ny patient					Log ud
		A Pa	rt of ProSang CSAM Health		

5. Scan 2D barkoden på patientarmbåndet, hold scanneren på tværs af armbåndet, så den almindelige stregkode ikke scannes. Patientens personnummer fremkommer i feltet Patient-id.



6. Scan de to stregkoder på blodkomponenten, som vist på billedet: først 1 og dernæst 2 (2D barkoden må IKKE benyttes).

	Patientinformation	Transfusionsmed. analyser	Blodbestilling	Elektronisk opsætningskontrol	Rapportere	Transfusionshisto
¢	psætningskontro	ol				
						und hi
	Patient-id	xxxxxx-xxxx				
	Blodkomponent Del	1 V00421540006142				
	Del	2 E3846000	_			
		Udfør opsætningsl	control	_1		2

7. Vælg Udfør opsætningskontrol

Opsætningskontrollen er først udført og godkendt, når dette billede vises:

	Patientinformation	Transfusionsmed. analyser	Blodbestilling	Elektronisk opsætningskontrol	Rapportere	Transfusionshistorik				
(	Opsætningskontrol									
	Opsætningskontrol mellem XXXXX-XXXX og V0042 14 400386 L E3846000 Blodkomponenten må transfunderes til ovennævnte patient Reservationstiden er									
	Patient-id Blodkomponent Del Del	1 2 Udfør opsætningsk	control	_ 1		2				

# **BLODKOMPONENTEN MÅ SÆTTES OP TIL PATIENTEN**

Hvis dette billede vises:

Patientinformation	Transfusionsmed. analyser	Blodbestilling	Elektronisk opsætningskontrol	Rapportere	Transfusionshistor
Opsætningskontr	ol				
Opsætni	ingskontrol mellem				
STOP voo421	442640442 E384600	00:			
Blodkon	nponenten er ikke re	serveret til patie	enten. Kontakt blodba	nken.	
					44
Patient-id	[				
Blodkomponent Del	1			200	
Del	2			There are	
	Udfør opsætnings	control			**
			1		and the second s
			-	Contraction of the local division of the loc	2

# **BLODKOMPONENTEN MÅ IKKE SÆTTES OP TIL PATIENTEN.** Kontakt blodbanken

8. Ved elektronisk opsætningskontrol transfusionsregistreres blodkomponenten samtidig.

### Håndtering af blodpose og transfusionsjournal

Efter transfusion kan blodposen kasseres, og transfusionsjournalen makuleres.

### Håndtering af transfusionskomplikation

I tilfælde af transfusionskomplikation kontaktes den lokale blodbank Ved alvorlig transfusionskomplikation kontaktes KIAs vagthavende læge (6541 3930) umiddelbart med henblik på udredning, behandling og registrering i DART (Dansk Registrering af Transfusionsrisici).

### Returnering af ikke anvendte blodkomponenter

Hvis den udleverede blodkomponent ikke anvendes til den pågældende patient, skal blodkomponenten så hurtigt som muligt returneres til blodbanken.