

Indtast introtekst

Hvad er Venlafaxin

Venlafaxin anvendes til behandling af depression og angsttilstande, men kan også anvendes til behandling af nervesmerter og kroniske smerter.

Hvordan hjælper Venlafaxin

Venlafaxin virker ved at øge signalstofferne, der findes naturligt i hjernen. Dette har betydning for ændring af impulsoverførelsen i hjernen. Det har vist sig, at ændringen af denne impulsoverførelse både har en effekt ved smertetilstande samt ved depressions/angsttilstande. Vi har ikke det fulde kendskab til denne virkningsmekanisme.

Hvordan tager jeg Venlafaxin

Venlafaxin er en depotkapsel, den tages 1 gang om dagen (morgen).

Du starter op i samarbejde med din kontaktsygeplejerske/læge på lav dosis, 75 mg i den første uge. Herefter vil dosis kunne øges, helt afhængigt af effekt og eventuelle bivirkninger. Vi vil i Smertecentret løbende have kontakt med dig enten via telefon eller ved fremmøde.

Før og under behandlingen vil vi, efter behov, tage et hjertekardiogram, blodprøver samt måle dit blodtryk.

Den smertestillende effekt opnås i løbet af de første par uger. Hvis det drejer sig om depression, må der forventes op til 4 ugers behandling før effekten kan vurderes.

Er der bivirkninger til Venlafaxin

Muligvis, men de aftager oftest efter de første par ugers behandling. Der er ikke alle, der får bivirkninger. Af bivirkninger kan nævnes: Kvalme, nedsat appetit, mundtørhed, hovedpine,

svimmelhed og nedsat sexlyst.

Der kan forekomme andre bivirkninger, og oplever du at humøret bliver væsentligt forværret, er det vigtigt at du kontakter din behandler.

Er du kendt med forhøjet blodtryk, er det vigtigt, at der er velreguleret inden start af medicin, og hvis det under behandling med Venlafaxin stiger, skal du kontakte din behandler.

Hvor læge og hvor meget ska jeg tage

Disse spørgsmål afklares i samråd med Smertecenter Syd, mens du er i behandling her. Du vil blive fulgt tæt i opstartsperioden.

Praktiske råd:

Venlafaxin kan give svimmelhed og virke døsende, hvorfor det kan påvirke ens evne til at føre motorkøretøjer. Hvis du føler dig påvirket, skal du undlade at køre bil og/eller arbejde med maskiner.

Det er vigtigt, at kapslerne tages hele. Dvs. de må ikke åbnes eller tygges.

De bør tages i forbindelse med et måltid.

Du må gerne tage anden medicin sammen med Venlafaxin, og hvis du er i tvivl, kan du spørge din kontaktlæge eller egen læge.

Du må ikke pludselig stoppe med behandlingen, da det kan forværre din smertetilstand og du kan få bivirkninger i form af svimmelhed og utilpashed.

Det er derfor vigtigt med langsom udtrapning. Hvis du er i tvivl om noget i din behandling, er du meget velkommen til at kontakte os i Smertecentret.