

Vejledning – opsamling af *Helicobacter Pylori* antigen afføringsprøve

Din forberedelse inden prøvetagning

Brug af antibiotika og stærkt syredæmpende medicin (proton-pumpe hæmmere) kan give forkerte testresultater.


- Kur mod *Helicobacter Pylori* eller anden antibiotika-behandling skal være afsluttet mindst 4 uger før testen udføres.
- Brug af stærkt syredæmpende medicin (fx Omeprazol, Pantoprazol og Nexium) skal være ophørt 2 uger før testen udføres.

Ud over disse to forbehold må du spise, drikke og tage din anden medicin, som du plejer.

Remedier

Prøverør med podepind	Fæces opsamlingspapir	Kuvert	Vejledning	Prøvetagnings-blanket
				

Fremgangsmåde for opsamling af afføringsprøve

	Trin 1: Gør FecalSwab-røret klar Sæt label med stregkoden på FecalSwab-røret. Barkoden skal sættes på langs af prøverøret og skal dække den eksisterende etikette.
 Set skråt ovenfra	Trin 2: Fold Fæces opsamlingspapiret ud og sæt det fast på toiletsædet Læs vejledning på opsamlingspapiret. Kontrollér, at opsamlingspapiret sidder godt fast på toiletsædet.
 Set fra siden	Trin 2 fortsat Undgå urin på afføringen. <i>Hvis du ikke har fået udleveret fæces opsamlingspapir af din praktiserende læge eller brugen af det mislykkes, kan du bruge flere lag toiletpapir til at holde afføringen over vandet i toilettet (meget vigtigt).</i>

	Trin 3: Opsamling af afføringsprøven Brug podepinden fra FecalSwab'en til at overføre afføring til røret (FecalSwab) – mængden skal svare til en grønært. Vær opmærksom på der er væske i FecalSwab røret. Væsken må ikke løbe ud  Skub podepinden helt ned til bunden af plastkrøret og knæk podepinden sv.t. brudzonen. Kom FecalSwab i plastikposen og så begge i kuerten. <i>Skru låget godt fast på prøveglasset!</i> Notér, hvornår prøven er opsamlet på etiketten på plastikposen.
	Trin 4: Skyl ud Brug stort skyl. Der bør trækkes ud 2-3 gange sv.t. 10-15 l vand for at sikre, at fæces opsamlingspapir og fæces skylles ud.
	Trin 5: Forsendelse Forsendelsesrøret i plastikposen lægges i medfølgende adresserede kuvert til Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH, Sygehusenheden i Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg. <i>Det er vigtigt, at denne prøve kommer hurtigt frem til hospitalet for, at den er brugbar. Derfor kan du aflevere kuerten hos:</i> Din egen læge (mandag – fredag). AFLEVERES HELST INDEN KL. 12.00, så prøve kan nå til laboratoriet samme dag. I en PostNord postbutik/Pakkeshop (mandag – torsdag). Må ikke sendes op til en weekend (fredag). På et af følgende sygehuslaboratorier (mandag – fredag kl 8-15): • Odense: Blodprøver og Biokemi, Blodprøvetagningsambulatoriet, Klørvænget 47, indgang 40, 5000 Odense • Nyborg: Klinisk Biokemisk Ambulatorium Nyborg, Vestergade 17, 5800 Nyborg • Svendborg: Klinisk Biokemisk Ambulatorium, Baagøes Alle 15, Indgang 85, 1. sal, Rum S, 5700 Svendborg • Ærø: Klinisk Biokemisk Ambulatorium, Sygehusvejen 18, 5970 Ærø
Svar	Trin 6: Resultat Selvom resultatet vil være tilgængeligt på Sundhed.dk, er det vigtigt, at du taler med den læge, der har bestilt undersøgelsen, om, hvordan svaret skal tolkes, samt hvordan der skal handles på svaret.